

Estudo Técnico Preliminar

1. Introdução

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS MEDICAMENTOS PARA ABERTURA DE LICITAÇÃO PARA ATENDER A ROTINA DO HOSPITAL, ROTINA CIRÚRGICA E/OU URGÊNCIA/EMERGÊNCIA.

2. Justificativa

Medicamentos padronizados no hospital FUSAM, porém não contratados no PE 019/2024. Tais medicamentos são imprescindíveis para assistência aos pacientes internados, atendimento de rotina do centro cirúrgico e/ou urgência/emergência. O hospital é porta aberta e pode ser usado a qualquer momento.

3. Previsão de Contratação Anual.

Previsto para utilização na rotina hospitalar, rotina cirúrgica e/ou urgência/emergência no prazo de 12 (doze) meses.

4. Requisitos da contratação

- Cópia da Autorização de funcionamento da empresa,
- Cópia da Licença de Funcionamento (Alvará sanitário),
- Cópia da Licença de Funcionamento do Fabricante,
- Certificado de Registro do Produto, expedido pela ANVISA
- Certificado de Regularidade no CRF.

5. Quantitativo e especificidade

Nº de Ordem	Descritivo	Unidade de Medida	Quantidade
1.	CEFTRIAXONA 1G IM C/ DILUENTE 3,5ML	FR-AMP	1100
2.	CLOPIDOGREL 75MG CP	CP	6000
3.	DOBUTAMINA 250MG/20ML AMP IV	AMP	4600
4.	FENOBARBITAL 100MG CP	CP	600
5.	LIDOCAINA, CLORID 2% C/ EPINEFRINA F/A 20ML	FRC	200
6.	MORFINA, SULFATO 2MG/2ML AMP	AMP	2000
7.	OMEPRAZOL 20MG CP	CP	15000
8.	PROMETAZINA, CLORIDRATO 50MG/2ML AMP	AMP	5000
9.	PROPATILNITRATO 10MG CP	CP	1500
10.	TERBUTALINA 0.5MG/ML AMP IV/SC	AMP	2500

CEFTRIAXONA 1G IM C/ DILUENTE 3,5ML - Infecções causadas por germes sensíveis à ceftriaxona, como por exemplo: Seps; Meningite; Borreliose de Lyme (Doença de Lyme); Infecções intra-abdominais (peritonites, infecções do trato gastrointestinal e biliar); Infecções ósseas, articulares, tecidos moles, pele e feridas; Infecções em pacientes imunocomprometidos; Infecções renais e do trato urinário; Infecções do trato respiratório, pneumonia e infecções otorrinolaringológicas; Infecções genitais, inclusive gonorréia; Profilaxia de infecções pré-operatórias.

CLOPIDOGREL 75MG CP - é indicado para a prevenção secundária (após a ocorrência) dos eventos aterotrombóticos, como por exemplo, infarto agudo do miocárdio (IM) (infarto do coração), acidente vascular cerebral (AVC) (derrame) e morte vascular em pacientes adultos que apresentaram IM ou AVC recente ou uma condição conhecida como doença arterial periférica (doença nos vasos sanguíneos dos membros). Síndrome Coronária Aguda: nos pacientes com Síndrome Coronária Aguda (SCA) [angina instável (tipo severo de dor no peito) ou IM], incluindo tanto aqueles controlados clinicamente, quanto os submetidos à Intervenção Coronária Percutânea com ou sem colocação de stent (prótese nas artérias do coração).

DOBUTAMINA 250MG/20ML AMP IV - é usado para aumentar a contratilidade cardíaca no tratamento de insuficiência cardíaca aguda resultante tanto de doença cardíaca orgânica como de procedimentos cirúrgicos cardíacos.

FENOBARBITAL 100MG CP - é um barbitúrico com propriedades anticonvulsivantes, devido à sua capacidade de elevar o limiar de convulsão. Age no sistema nervoso central, utilizado para prevenir o aparecimento de convulsões em indivíduos com epilepsia ou crises convulsivas de outras origens.

LIDOCAINA, CLORID 2% C/ EPINEFRINA F/A 20ML - indicado para produção de anestesia local ou regional por técnicas de infiltração como a injeção percutânea; por anestesia regional intravenosa; por técnicas de bloqueio de nervo periférico como o plexo braquial e intercostal; e por técnicas neurais centrais, como bloqueio peridural lombar e caudal.

MORFINA, SULFATO 2MG/2ML AMP - é um analgésico opioide forte, sistêmico, usado para o alívio da dor intensa. O uso de Sulfato de Morfina para o alívio da dor deve ser reservado para as manifestações dolorosas mais graves, como no infarto do miocárdio, lesões graves ou dor crônica severa associada ao câncer terminal.

OMEPRAZOL 20MG CP - EM BLÍSTER (não em frasco) - é indicado para tratar certas condições em que ocorra muita produção de ácido no estômago. É usado para tratar úlceras gástricas (estômago) e duodenais (intestino) e refluxo gastroesofágico (quando o suco gástrico do estômago volta para o esôfago). Muitas vezes o omeprazol é usado também na combinação com outros antibióticos para tratar as úlceras associadas às infecções causadas pela bactéria *Helicobacter pylori*. O omeprazol também pode ser usado para tratar a doença de Zollinger-Ellison, que ocorre quando o estômago passa a produzir ácido em excesso. Também é utilizado para tratar dispepsia, condição que causa azia, arrotos ou indigestão. Pode ser usado também para evitar sangramento do trato gastrointestinal superior em pacientes seriamente doentes.

PROMETAZINA, CLORIDRATO 50MG/2ML AMP - é indicado para rinite (alérgica ou vasomotora); conjuntivite alérgica; prurido (coceira); urticária; angioedema; rinorreia (corrimento nasal); dor pós-cirúrgica (adjunto a analgésico); reação anafilática ou anafilactoide (tratamento adjunto); adjunto na pré e pós-cirurgia, como sedativo-hipnótico; prevenção e tratamento de: enjôo em viagem; náusea ou vômito (em anestesia e cirurgia).

PROPATILNITRATO 10MG CP - Propatilnitrato é indicado no tratamento de episódios agudos na angina pectoris e para prevenção de crise aguda de angina produzida por exercícios em pacientes com insuficiência coronariana crônica.

TERBUTALINA 0.5MG/ML AMP 1ML IV/SC - é destinado ao tratamento da asma brônquica, bronquite crônica, enfisema e outras pneumopatias que apresentem broncoespasmo. Também é indicado como miorelaxante uterino no manuseio do trabalho de parto prematuro não complicado.

6. Levantamento de Mercado

Menor preço e entrega rápida de 5 a 7 dias.

7. Descrição da Solução como um todo

Trata-se de aquisição de medicamentos imprescindíveis na rotina hospitalar, tanto a pacientes internados, quanto a rotina cirúrgica e também para a assistência a urgências/emergências. As demais especificações técnicas e quantitativo dos itens estão disposto no Termo de Referência.

8. Justificativa para parcelamento ou não

Previsto para utilização anual com entregas parceladas conforme necessidade da FUSAM.

9. Demonstrativo de resultados pretendidos

Esta quantidade sugerida será suficiente para a assistência hospitalar no prazo de 12 (doze) meses.

10. Providências a serem tomadas pela Administração

Providenciar a licitação dos referidos itens para utilização nos próximos 12 (doze) meses, para a assistência na rotina hospitalar, rotina cirúrgica, e nas urgências/emergências do hospital.

11. Impactos Ambientais

Não se aplica.

12. Conclusão

Providenciar a licitação dos referidos itens para utilização nos próximos 12 (doze) meses, para a assistência na rotina hospitalar, rotina cirúrgica, e nas urgências/emergências do hospital, pois os termos dos contratos estão próximos do vencimento.

Sendo assim, declaramos para os devidos fins, que os requisitos do presente Estado Técnico Preliminar serão cumpridos na íntegra.

DATA: 15/06/2024

Assinatura da unidade requisitante