


Abidor[®]

paracetamol

FORMAS FARMACÊUTICAS E APRESENTAÇÕES

Forma farmacêutica: solução oral - gotas

Concentração do princípio ativo: 200 mg/mL

Linha farma: Cartucho contendo frasco plástico opaco com 15 mL.

Linha hospitalar: Caixa contendo 200 frascos plásticos opacos com 15 mL cada

USO ORAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS

Composição:

Cada mL (13 - 15 gotas) da solução oral contém:

paracetamol.....200 mg

Excipientes q.s.p.....1 mL

Excipientes: macrogol, ciclamato de sódio, sacarina sódica, ácido cítrico, metabissulfito de sódio, citrato de sódio, benzoato de sódio, hidróxido de sódio, aroma de tutti frutti líquido artificial, corante amarelo de quinolina e água purificada.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

INDICAÇÕES

Uso adulto.

Indicado para redução da febre e o alívio temporário de dores leves a moderadas, tais como dores associadas a resfriados comuns, dor de cabeça, dor no corpo, dor de dente, dor nas costas, dores musculares, dores leves associadas a artrites, dor de garganta e cólica menstrual.

Uso pediátrico.

Indicado para a redução da febre e para o alívio temporário de dores leves a moderadas, tais como: dores associadas a gripes e resfriados comuns, dor de cabeça, dor no corpo, dor de dente, dor nas costas, dores musculares, dores leves associadas a artrites, dor de garganta e cólica menstrual.

MODO DE USAR

USO ORAL. USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS

Uso pediátrico.

Para crianças abaixo de 11 kg ou 2 anos: consultar o médico antes de usar. A dose recomendada de paracetamol varia de 10 a 15 mg/kg/dose (1 gota/kg/dose), com intervalos





de 4 a 6 horas entre cada administração. Não exceda 5 administrações (aproximadamente 50 – 75 mg/kg - 3 a 5 gotas/kg), em um período de 24 horas.

Uso adulto (acima de 12 anos).

A dose diária máxima de paracetamol é de 4000 mg administrados em doses fracionadas, não excedendo a dose de 1000 mg/dose no intervalo de 4 a 6 horas, no período de 24 horas.

Duração do tratamento: depende da remissão dos sintomas.

ADVERTÊNCIAS

A dose recomendada de paracetamol não deve ser ultrapassada. **NÃO** administrar este medicamento diretamente na boca do paciente. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Não use com outro produto que contenha paracetamol. Este medicamento contém paracetamol. Pacientes adultos podem desenvolver insuficiência hepática aguda no caso de ingestão de mais de 4g de paracetamol em 24 horas, uso concomitante de outros medicamentos contendo paracetamol ou ingestão de 3 ou mais doses de bebida alcoólica por dia durante o tratamento. Consulte seu médico antes de usar o medicamento se você já possui problemas no fígado. Consulte seu médico antes de utilizar este medicamento se você está tomando varfarina ou outros derivados cumarínicos.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO

Conservar em temperatura ambiente (temperatura entre 15 a 30 °C). Após aberto, válido por 12 meses.

Para correta utilização deste medicamento, solicite orientação do farmacêutico.

AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.

MEDICAMENTO NOTIFICADO conforme RDC nº 576/2021.

Farmacêutico Responsável: Rodrigo Rebelo Peters - CRF/SC 4116

AIRELA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA

Rodovia SC 390, Km 459, nº 500, Bairro Ilhota, Distrito Industrial

CEP: 88720-000, Pedras Grandes, SC

C.N.P.J.: 01.858.973/0001-29

INDÚSTRIA BRASILEIRA



PAPEL RECICLÁVEL

SIA Serviço de
Informação
Airela
0800 646 2010
www.airela.com.br

airela
PHARMACÊUTICA

